

	Gruppo di studio (OMT)	Gruppo controllo (sham)	p < t
Età	41.8 ± 6.6	42.7 ± 8.0	0.73
Genere			0.70*
Maschio	9 (60)	11 (73.3)	
Femmina	6 (40)	4 (26.7)	
BMI	24.1 ± 3.5	25.5 ± 2.4	0.19
Stato civile			1.00*
Non coniugato	7 (46.7)	6 (40)	
Coniugato	8 (53.3)	9 (60)	
Grado di istruzione			0.62*
Scuola media	2 (13.3)	2 (13.3)	
Media superiore	4 (26.7)	5 (33.4)	
Laurea triennale	5 (33.3)	2 (13.3)	
Laurea magistrale	4 (26.7)	6 (40)	
Durata patologia (m))	15.1 ± 9.2	14.1 ± 6.7	0.72
Punteggi totali			
BAQ	68.5 ± 31.4	51.8 ± 30.0	0.15
STAY-Y1	42.4 ± 3.4	42.7 ± 2.9	0.85
STAY-Y2	41.3 ± 3.0	41.1 ± 3.7	0.87
Punteggi dolore			
McGill			
S-PRI	16.5 ± 5.0	16.6 ± 5.9	0.94
A-PRI	6.3 ± 2.7	6.3 ± 2.7	1.00
T-PRI	22.7 ± 6.8	22.9 ± 8.1	0.96
PPI	3.5 ± 0.5	3.5 ± 0.6	1.00
VAS	63.1 ± 21.4	57.5 ± 17.3	0.1
Oswestry	24.9 ± 3.3	26.0 ± 5.2	0.51
Roland-Morris	15.5 ± 4.0	15.3 ± 4.9	0.9

Tabella 1. Descrizione del campione alla linea di base. Valori di p da t test. *valori di p da X²
 BMI=indice di massa corporea; BAQ=Body Awareness Questionnaire; S-PRI=Sensory Pain Rating Index; A-PRI=Affective Pain Rating Index; T-PRI=Total Pain Rating Index; PPI=Present Pain Intensity Index; VAS=Scala analogica visiva.