

TABELLA 1 | Valori di base del trattamento manipolativo osteopatico (TMO), terapia simulata e gruppi di controllo.

	TMO	Terapia simulata	Controllo	F	p adj
Età*	26,5 ± 8,8	28 ± 8,1	25,6 ± 8,2	0,46	0,63
BMI*	18,9 ± 8,8	18,7 ± 2,4	18,0 ± 3,3	0,46	0,63
Maschi [§]	10 (53)	14(74)	10 (53)	-	0,31
Precedente TMO [§]	5 (26)	8 (42)	8 (42)	-	0,5
Tabagisti [§]	7 (37)	6 (32)	7 (37)	-	0,93
auHF*	1391 ± 1850	1138 ± 650	944 ± 1563	0,92	0,40
nuHF*	47,12 ± 26,36	50,85 ± 17,4	46,8 ± 18,5	0,34	0,71
auLF	1138 ± 676	1481 ± 2098	1290 ± 1705	0,89	0,48
nuLF*	54,34 ± 26,37	48,99 ± 17,41	53,14 ± 18,52	0,61	0,55
DFAa1*	1,05 ± 0,33	0,91 ± 0,19	0,96 ± 0,26	0,55	0,58
LF/HF*	2,34 ± 2,6	1,28 ± 1,09	1,87 ± 2,41	0,47	0,63

I numeri nella tabella sono: *media ± sd, [§]n. valori p da *ANOVA e §test del chi quadro.